

Ein Fall
von congenitaler Sakralgeschwulst
bei einem halbjährigen Kinde.

INAUGURAL-DISSERTATION

der

medizinischen Fakultät zu München
zur Erlangung der Doktorwürde

in der

Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe

unter dem Präsidium

des Herrn

PROF. DR. O. BOLLINGER

ord. ö. Professor etc.

vorgelegt vom Verfasser

Franz Birkholz

prakt. Arzt

München, 1885.

K. Hof- und Univ.-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn.

**Ein Fall
von congenitaler Sakralgeschwulst
bei einem halbjährigen Kinde.**

INAUGURAL-DISSERTATION

der

medizinischen Fakultät zu München

zur Erlangung der Doktorwürde

in der

Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe

unter dem Präsidium

des Herrn

PROF. D^R. O. BOLLINGER

ord. ö. Professor etc.

vorgelegt vom Verfasser

Franz Birkholz

prakt. Arzt.

München, 1885.

K. Hof- und Univ.-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn.

Dem Herrn

Geheimen Medicinalrath

PROFESSOR DR. DOHRN

in Hochachtung gewidmet

vom

Verfasser.

Das Kind, dessen Sakralgeschwulst wir zum Gegenstande unserer Besprechung gewählt haben, wurde als der sechs Monate alte Sohn des Eigenkätchner Maufchering von seinen Eltern am 29. Oktober 1884 der Kgl. Gynäkologischen Klinik zu Königsberg i. Pr. zur Behandlung überwiesen.

Die Anamnese ergab in Betreff der Eltern des Kindes, daß dieselben aus Familien stammten, die in keiner Weise hereditär belastet gewesen sein sollen und daß sie selbst sich bis zur Gegenwart stets gesund und wohl gefühlt haben. — Die Mutter, zur Zeit der Geburt des Kindes im Alter von 26 Jahren, hat während der Schwangerschaft — dieselbe ist primi-para — sich stets wohl befunden und erfolgte die Geburt ohne Anomalien am normalen Ende der Schwangerschaft. Schon gleich nach der Geburt will die Mutter an dem Kinde eine dem mittleren Theile des Kreuzbeins aufsitzende, etwa pflaumengroße, rundliche Geschwulst bemerkt haben, während es im Uebrigen körperlich recht gut entwickelt sein soll. An der Form des Schädels und Gesichts wollen die Eltern keine besonders auffallende Abnormitäten vermerkt haben, ebenso an den übrigen Theilen des Körpers keine Entwicklungsfehler. In der Folgezeit hat das Kind bei künstlicher Ernährung mit der Flasche in normaler Weise zugenommen, mit seinem Wachsthum zeigte sich jedoch auch zugleich ein stetiges Größerwerden der Geschwulst am Kreuzbein, deren Umfang namentlich in den letzten Wochen ganz besonders rasch zugenommen haben soll. —

Bei der Aufnahme des Kinds in der Klinik ergibt sich am 29. Oktober 1884 folgender Status präsens; Fritz Mauscherling erscheint als ein für sein Alter von 6 Monaten recht kräftig entwickelter Knabe. Die Bewegungen der Extremität zeigen sich normal. Der Schädel erscheint auffallend rund, ist gröfser als es dem Alter des Kindes entspricht und hat stark vorgewölbte Stirnbeine. In beiden Schläfengegenden ist die Haut gespannt, glänzend und läfst stark ausgedehnte Venennetze durchscheinen. Die grofse Fontanelle ist circa $3\frac{1}{2}$ cm lang und 2 cm breit. In Betreff der Sinnesthätigkeit ergeben sich, soweit das kindliche Alter eine Beurtheilung zuläfst, keinerlei Anomalien. — Genau in der Mitte des Kreuzbeines befindet sich eine kugelrunde etwa orangegrofse Geschwulst, welche mit einem breiten Stiel dem Knochen aufzusitzen scheint. Die glatte Oberfläche des Tumor ist in den unteren Partien von normaler Haut bedeckt, diese verdünnt sich jedoch nach der Kuppe hin mehr und mehr, indem sie ein glasiges, glänzendes Aussehen annimmt.

In diesen oberen Partien erscheint die stark verdünnte Haut überall von kleinen, bläulich durchscheinenden Gefäfsen durchzogen. In der Nähe des Stiels, welcher sich nach oben in der Höhe des letzten Lendenwirbel nach abwärts in der Höhe des V. Kreuzbeinwirbel begrenzt, läfst sich durch die Palpation ein deutlicher Defect im Knochen nicht nachweisen. Die Geschwulst fluctuirt, ergibt Transparenz und steht ihr Inhalt aller Wahrscheinlichkeit nach mit dem Spinalkanal in Zusammenhang, da bei kräftigem Schreien und Pressen des Kinds sie sich praller spannt, bei Druck auf dieselbe die Haut sich in der Gegend der grofsen Fontanelle etwas vorwölbt und daneben eine bedeutende Verkleinerung des Tumors erfolgt, während Hirnerscheinungen nicht auftreten. Eine grubenförmige Vertiefung auf der Polhöhe der Geschwulst besteht nicht.

Nach den Ergebnissen dieser Untersuchung durfte der

vorliegende Sakraltumor als eine Cystengeschwulst bezeichnet werden, deren Inhalt mit dem Spinalkanal in Zusammenhang stehe, also mit Wahrscheinlichkeit als eine Meningocele, denn es sprachen besonders hierfür der Sitz, die Transparenz und Fluctuation der Geschwulst, die Verkleinerung derselben auf Druck, wobei eine deutliche Vorwölbung an der großen Fontanelle, das Fehlen einer nachweisbaren Knochenlücke an der Basis des Tumor sowie von Motilitätsstörungen, Deformitäten der untern Extremitäten und sonstigen Entwicklungsfehlern.

Der Verlauf des vorliegenden Falles gestaltete sich nun so, daß schon am Tage nach der Aufnahme ein operatives Eingreifen indicirt erschien. Es stand nämlich eine Spontanruptur der Kuppe des Tumor, wo die Haut sich im höchsten Grade verdünnt zeigte und gangränös zu werden begann, in kürzester Zeit zu erwarten. Dadurch wäre das Leben des Kindes in höchstem Grade gefährdet worden, denn der plötzliche Abfluß der Cerebrospinalflüssigkeit sowohl als eine Infection von der Perforationsstelle aus mit nachfolgender Meningitis hätten zu schnellem Tode führen können.

Um diese Gefahren zu vermeiden wurde am 30./X. folgendes Operationsverfahren eingeschlagen:

Nach einer genauen Reinigung des Operationsfeldes wird der Tumor an der Basis mit einer Gummiligatur umschnürt, welche den plötzlichen Flüssigkeitsabfluß sowie das Eindringen von Infektionsstoffen verhindern sollte. Dicht oberhalb der Ligaturstelle werden darauf 2 Nadeln kreuzweise durchgestochen, um das Abgleiten der Ligatur zu hindern, und nun ein Längsschnitt über die Geschwulst geführt. Es entleerte sich hierbei eine klare seröse Flüssigkeit in der Menge von 200 ccm, welche zur genauern Untersuchung aufgefangen wurden. Nach der Entleerung konnte man in dem umschnürten Ringe bei Respirationsbewegungen des Kindes das Niveau der noch in der Tiefe befindlichen Flüssigkeit steigen und fallen sehen. Eine Infertion des Rückenmarkes an der Innenwand

der Cyste fand nicht statt; es reichte überhaupt das Rückenmark gar nicht über den umschnürten Ring hinaus und waren auch grössere Nervenfränge oberhalb der Umschnürungsstelle in der Wandung der Cyste nicht zu konstatiren.

Nach der Incision wurde der Tumor ringsum dicht oberhalb der Durchstechungsnadeln durch Schnitt abgetragen und die Wundränder durch Seidenligaturen vereinigt. Durch die Naht fand ein vollständiger Schluss der Wunde statt und es quoll nirgends etwas Flüssigkeit zwischen den Suturen hervor. Die vereinigte Wunde wurde nun mit etwas Jodoform überstreut, die Enden der stecken bleibenden Nadeln mit Watte umwickelt, um Druckverletzungen zu vermeiden, und darüber ein typischer Listerverband angelegt.

Das Kind, welches sich während der Operation ohne Narkose ziemlich ruhig verhalten hatte, zeigte auch im Verlaufe des Operationstages ein ziemlich gutes Allgemeinbefinden und nahm auch wie gewöhnlich die ihm dargereichte Nahrung (2 Kuhmilch: 1 Wasser).

31/X. Das Kind hat die Nacht hindurch ziemlich ruhig geschlafen, heute dagegen erscheint es bedeutend unruhiger.

Die Nahrungsaufnahme ist geringer, der Schlaf während des Tages sehr wenig. Bei dem vorgenommenen Verbandwechsel erscheinen die obere und untere Partien der Wunde bläulich verfärbt. Nach Entfernung der Ligatur, sowie der Nadeln, welche an den Enden mit etwas angetrocknetem Blute (Rost?) bedeckt sind und sich vor der Extraction nicht gut reinigen liessen, wird die Suturlinie flacher und quillt beim Schreien des Kindes eine wasserhelle Flüssigkeit zwischen den Nähten durch, so dass noch 2 Suturen eingelegt werden, wodurch einem weiteren Ausfliessen vorgebeugt ist. Die Wunde wird jetzt noch zur Verminderung der Spannung durch einige Heftpflasterstreifen zusammengezogen und darüber wieder ein antiseptischer Verband angelegt.

1./XI. Die Unruhe nimmt heute noch mehr zu. Die

Morgentemperatur zeigt 39°C . Das Gesicht erscheint blaß, die große Fontanelle etwas abgeflacht, die Injection der Venen der Schädeloberfläche ist nicht stärker als früher. Beim Verbandwechsel markiren sich die verfärbten Partien als gangränös, während in der Mitte der Wunde die Haut gut erhalten ist. —

2/XI. Die Temperatur bleibt den Tag hindurch über 39°C . Das Kind ist ebenso unruhig als gestern, nimmt nur mit Widerwillen die Flasche und schläft sehr unruhig. Das Gesicht erscheint blaß, die große Fontanelle bei ruhigem Athmen etwas abgeflacht, weniger beim Schreien des Kindes. Die Analöffnung ist heute stets offen, so daß fast beständig Koth entleert wird. Bei dem Verbandwechsel werden einige Suturen aus den nekrotischen Partien entfernt. —

3/XI. Das Kind ist die Nacht hindurch sehr unruhig gewesen. Die Morgentemperatur beträgt wieder über 39°C . Der Kopf ist stark nach hinten gebogen. Die große Unruhe wird nach Application kalter Umschläge um den Kopf und nach 0,01 Calomel etwas geringer, so daß ein mehrstündiger Schlaf eintritt. Die Reaction der Pupille ist normal. Gegen Abend nimmt die Unruhe wieder stark zu, während die Temperatur auf 40° steigt. Beim Verbandwechsel zeigt sich, daß in der Mitte der bis dahin gut verklebten Suturlinie, die Fäden durchzuschneiden beginnen und die Wundränder — trotz der Kontraktion mit Heftpflasterstreifen — auseinanderweichen. Dabei findet ein Herausfickern ganz erstaunlich großer Mengen von Cerebrospinalflüssigkeit statt. Es werden die nekrotischen Partien zum Theil entfernt und den Tag hindurch kalte Umschläge applicirt.

4/XI. Im Allgemeinen status idem, nur ist die Nackenkrümmung stark ausgeprägt und zwar derartig, daß selbst bei Rückenlage die Lordose nicht ausgeglichen wird. Es besteht eine auffallende Neigung mit der Faust die Gaumen zu reiben deren Ränder überall gleichmäßig hart und normal erscheinen.

Der Gesichtsausdruck ist matt. Beim Verbandwechsel werden einige Suturen entfernt.

5/XI. Während des Tages bestehen wie gestern Körpertemperaturen von 39,4 bis 40,1° C.; die Nackenkrümmung ist stärker ausgeprägt, daneben grosse Unruhe und Empfindlichkeit bei jedem Versuche das Kind zu bewegen. Seit vorgestern des Abends fehlt der Stuhl. Die Bewegungen der oberen Extremität erscheinen zuckend. An der Wunde wird fast der ganze Rest der mumifizirten Partie mit der Scheere entfernt und alsdann kalte Umschläge gemacht.

6/XI. Nach der Application eines Seifenstuhlzäpfchens findet reichliche Kothentleerung statt. Das Allgemeinbefinden hat sich nicht gebessert, es bestehen vielmehr deutliche Zeichen einer beginnenden Meningitis. An der Wunde ist mit Ausnahme der immer noch herausickernden Cerebrospinalflüssigkeit keine wesentliche Veränderung zu konstatiren.

7/XI. Die Temperatur ist beständig hoch febril. Das Kind erscheint ermattet. Daneben besteht eine grosse Unruhe und geschehen mit den oberen Extremitäten krampfhaft zuckende Bewegungen, während die untern Extremitäten sich ruhiger verhalten. Die Fontanelle ist flach, die Nahrungsaufnahme sehr gering, der Schaf fehlt fast vollständig. Beim Verbandwechsel werden die letzten Suturen entfernt, die Wundränder erscheinen schlaff, blafs und klaffen, indem etwas Cerebrospinalflüssigkeit hervorquillt.

8/XI. Das Allgemeinbefinden hat sich noch mehr verschlechtert. Die Pupillenreaktion geschieht schwach. Es bestehen fast fortwährend klonische Zuckungen des ganzen Körpers. An der Wunde ergiebt sich beim Verbandwechsel nichts Neues. Nach Application eines Blutegel in die Nackengegend und nach zwei warmen Vollbädern tritt für einige Stunden Ruhe und etwas Schlaf ein.

9/XI. Bis Mittag stat. id., dann macht sich besonders ein schnelles, röchelndes Athmen bemerkbar. Die ad maximum

dilatirten Pupillen sind reaktionslos und es erfolgt der exitus letalis um 5 Uhr Nachmittags unter den Erscheinungen von Lungenödem.

Sectionsbefund.

Bei der am 11/XI. vorgenommenen Section zeigte sich entsprechend der Operationsstelle, also über dem Kreuzbein, ein langs-ovaler Defect der Hautdecken ca. 5 cm lang und 3 cm breit, derselbe vertieft sich in der Mitte bis etwa 1½ cm. Die Haut bildet am Rande des Defectes unregelmäßige Wülste, während in der Tiefe die Oberfläche von einem granulations-ähnlichen, rothen Gewebe gebildet wird.

Bei Eröffnung der Wirbelsäule zeigen sich die Wirbelbogen bis zum 4. Lendenwirbel hin wohl erhalten, hingegen ist der 5. Lendenwirbelbogen durch eine fibröse Platte ersetzt. An den Sakralwirbeln fehlt die hintere Begrenzung vollständig, so daß die Wirbelkörper sich unmittelbar in der Tiefe des Defectes befinden. Nach Spaltung der Dura des Spinalkanals gelangt man vom Subduralraum mit einer von oben eingeführten Sonde direct auf den Boden des Defectes, indem die Dura mater sich nach einer trichterförmigen Ausbreitung in der Wand desselben verliert. Das Rückenmark ragt bis in den Sakralkanal hinein und liegt sein unterstes Ende im obern Theil des Defectes etwa in der Höhe des ersten Kreuzbeinwirbel mit eitrigem Belag bedeckt zu Tage. Das peridurale Fettgewebe im Wirbelkanal erscheint sehr blutreich, ebenso sind die weichen Hirnhäute stark injiziert. Das subarachnoideale Gewebe zeigt sich mit Eiter erfüllt, welcher besonders im untern Dorsalmark und obern Teil des Lendenmark angehäuft ist, ebendasselbst findet sich eine ziemlich dicke Lage von Blut.

Das Gehirn, welches im allgemeinen sehr blutreich ist, zeigt abgeplattete Windungen und nach Einschnitten eine Erweiterung der reichlich mit klar, seröser Flüssigkeit erfüllten Ventrikel bis auf das Doppelte und mehr, entsprechend den Verhältnissen eines Hydrocephalus internus. In den Schädel-

gruben an der Basis sammelt sich bei Herausnahme des Hirns eine reichliche Menge seröser Flüssigkeit an. Die weichen Hirnhäute sind etwas weißlich getrübt, aber nicht eitrig infiltriert. In den übrigen Organen herrscht ziemlich starke Anämie, ohne dass besonders und speziell auf Entwicklungsfehler zu beziehende Veränderungen sich vorfinden.

Eine genauere Untersuchung des von der Section zurückbehaltenen Präparates, welches sich zusammensetzt aus dem Rückenmark mit dessen Häuten und den hintern Bogen sämtlicher Wirbelkörper, dem Kreuz- und Steißbein und dem Reste des Sakraltumor ergab folgendes:

Die Wirbelbogen erschienen bis zum IV. Lendenwirbel incl. normal, an Stelle des V. Lendenwirbelbogen befindet sich eine fibröse Platte.

An den Kreuzbeinwirbeln fehlt die hintere Begrenzung vollständig, die rudimentären 4 Steißbeinwirbel ergeben keine Anomalien.

Das Rückenmark, an welchem sich die bereits im Sectionsbefunde notirten pathologischen Erscheinungen bemerkbar machen, reicht bis in die Höhe des obern Randes des II. Kreuzbeinwirbel. Ein *filum terminale* sowohl als eine eigentliche *canda equina* existiren nicht, es erscheint vielmehr das untere Ende des Rückenmarkes konisch zugespitzt — wie ein Zapfen endend — und nur bis zum Abgang des V. Lendennerven-Paar von der *Arachnoidea* bedeckt.

Die Rückenmarksnerven entspringen bis incl. den I. Kreuzbeinnerven in normaler Weise, von da abwärts gehen die Nervenstränge nicht in symmetrischer Weise vom Rückenmark ab.

Ohne eine bestimmte Ordnung einzuhalten, gehen nun nämlich einige Nerven bald nach ihrem Ursprung vom Rückenmark in die Tiefe gegen die *foramina sacralia anteriora* hin, während andere erst gegen die Peripherie des Tumorrandes

ziehen, dort umbiegen und mehr oder weniger zurückkehrend sich dann theilen und in die Tiefe dringen.

Die Dura mater ist deutlich bis zum I. Kreuzbeinwirbel zu verfolgen, von da ab geht sie in das an der Hinterfläche des Kreuzbeins befindliche, granulationsähnliche Gewebe über und läßt sich nunmehr nicht genau nachweisen. Die bei der Operation abgetragene Wandung des Cystentumors zeigte im wesentlichen, von außen nach innen vorgehend, zunächst ein der äußern Haut entsprechendes Gewebe, sodann das Gewebe der dura mater.

Die aus dem Sakraltumor bei der Incision entleerte klar seröse Flüssigkeit hatte ein specifisches Gewicht von 1009. Durch Kochen und Zusatz von Essigsäure ergab sich ein mäßiger Gehalt an Eiweiß. Das weiter untersuchte Filtrat enthielt ziemlich viel Traubenzucker, wie dies durch die Trommersche-Probe nachgewiesen wurde, außerdem bei Anwendung der Phosphorwolframsäure-Reaction Spuren von Pepton, sodann reichliche Mengen von Chloriden und schwefelsauren Salzen.

Ueerblicken wir den vorliegenden Fall in seinem Verlaufe, sowie den Befund bei der Section behufs Rubricirung der Sakralgeschwulst, so haben wir ein halbjähriges Kind mit einer congenitalen Geschwulst in der Kreuzbeingegend, durch deren Untersuchung (siehe pag. 6) sich zunächst nur feststellen läßt, daß der Tumor eine Cystengeschwulst, deren Inhalt mit dem Sakralkanal in Verbindung steht, wahrscheinlich also eine Meningocele darstellt. Außer dieser Geschwulst bestanden die Zeichen eines Hydrocephalus, dessen Vorhandensein auch die Section bestätigte.

Die starke Verdünnung und beginnende Gangrän an der Kuppe der Cyste gaben dann — aus den oben erwähnten Gründen (siehe pag. 7) — die Indication zu dem früher beschriebenen Operationsverfahren. Es sollte dadurch nicht allein einer Spontanruptur vorgebeugt werden, sondern auch dadurch,

dafs an Stelle der dünnen Cyftenwandung stärkere Hautpartien vereinigt wurden, eine genügend feste Bedeckung geschaffen werden, welche dem Drucke sich neu ansammelnder Flüssigkeit dauernd Widerstand leistete. Leider erfüllte sich die Hoffnung des Zustandekommens einer primären Vereinigung der Wundränder nicht, es traten vielmehr Entzündungserscheinungen auf und es entwickelte sich bald nach der Operation das Krankheitsbild einer Meningitis cerebro-spinalis, charakterisirt durch grofse Unruhe des Kindes, Empfindlichkeit bei allen Bewegungsversuchen, hohe Fiebertemperaturen, Contractur der Nackenmuskeln, erst vereinzelte und später allgemein verbreitete Zuckungen und gegen das Ende allgemeine Ermattung und Reactionslosigkeit der ad maximum dilatirten Pupille. Der Sectionsbefund (siehe pag. 11) bestätigte das Bestehn einer Meningitis cerebro-spinalis und ergab zugleich eine Defectbildung im Bereiche des Spinalkanales an der Stelle, wo die Geschwulst fafs, einen Zustand also wie er im allgemeinen als Spina bifida bezeichnet zu werden pflegt.

Folgen wir behufs Rubricirung unseres Tumor der Einteilung, welche Dr. W. Koch*) für die verschiedenen Formen der Spina bifida gemacht hat, so haben wir vier besondere Typen zu unterscheiden, die Myelocoele spinalis, die Rhachischisis posterior und anterior, die Meningocoele spinalis.

Unter Myelocoele versteht Koch eine Verlagerung des Rückenmarks sammt seiner Umhüllung durch eine Lücke der Wirbelbogen, welche am häufigsten im Bereich des Kreuzbeins, daher er diese Form auch Myelocoele sacralis nennt im Gegensatz zu den seltneren Formen der Myelocoele cervicalis und dorsalis. Er vindicirt der sakralen Form einen ganz bestimmten Sitz und zwar an Stelle der hinteren Bogen der drei ersten Sakralwirbel. Der Knochendefect soll jedoch nur einige Millimeter betragen, er bildet die Bruchpforte der Myelocoele.

*) Mittheil. über Fragen der wissenschaftl. Medizin I. Kassel 1881, Beiträge zur Lehre der Spina bifida von Dr. W. Koch.

Der durale Bruchfack soll außer Liquorcerebrospinal-Flüssigkeit den untersten Theil des Rückenmarks sammt einem Theil der cauda equina enthalten; das Rückenmark selbst soll hart am obern Rande der Bruchpforte nach hinten umbiegen, und sich bis unter die Hautdecke des Kreuzbeins begeben, wo es angewachsen ist. —

Als zweite genetisch und anatomisch völlig verschiedene Mißbildung betrachtet Koch die Rhachischisis posterior, die entweder eine totale -- wobei die gesammte Wirbelsäule gespalten, die Bogentheile jenseits der Querfortsätze nach außen und hinten gerichtet, während in dem Wirbelspalt das Rückenmark breit, bandartig, durch eine tiefe mediane Längsfurche zwiegetheilt liegt -- oder eine partielle ist und dann im wesentlichen dieselben Eigenthümlichkeiten nur in geringerer Ausdehnung bietet. Die Rhachischis post. total. soll meistens mit Anencephalie, Hemicephalie oder Encephalorele complicirt sein. —

Für die Rhachischisis anterior ist characteristisch eine Spaltung der Wirbelkörper in sagittaler Richtung, eine meistens zu geringe Zahl von Wirbelkörpern und in hochgradigen Fällen eine Zerstörung des Rückenmarks schwerster Art sowie eine Complication mit Rachischisis posterior.

Die vierte Form, die Meningocele spinalis, zeichnet sich hauptsächlich dadurch aus, daß eine bruchfackähnliche, außerhalb des Wirbelkanals belegene Tasche der dura mater besteht, die einkammerig mit dem meningealen Hauptraum des Wirbelkanales durch einen kleinen, isthmusartigen Kanal kommuniziert und Cerebrospinalflüssigkeit aber kein Rückenmark enthält. Der Isthmus des Durafackes geht oft durch den Hiatus sacralis oder die Oeffnung für den Sack liegt nach Marchand*) zwischen zwei Wirbelbogen oder an Stelle eines oder mehrerer Bogen der Lenden oder Kreuzbeinwirbel. —

*) Prof. Felix Marchand, Real-Encyclopädie der gesammten Heilkunde Bd. XII 1882 pag. 599 Spina bifida.

Fragen wir, zu welcher der eben erwähnten Arten wir unseren Tumor rechnen dürfen, werden wir die 2te und 3te Gruppe sofort streichen, denn außer anderen Charakteren spricht besonders das Verhalten des Rückenmarks, welches nicht breit und bandartig sich erwies, sowie das Bestehen einer Hautbedeckung über der Spalte vollständig dagegen. Es handelt sich also darum ob wir vorliegenden Fall als *Myelocoele sacralis* oder *Meningocoele spinalis* zu bezeichnen haben.

Für eine *Meningocoele spinalis* spricht zunächst der Zusammenhang des Geschwulst Inhaltes mit dem Spinalkanal, erwiesen durch das Vorwölben der Haut in der Gegend der grossen Fontanelle bei Druck auf den Tumor, ferner durch den Sectionsbefund (cf. pag. 11) und durch den Nachweis eines der Cerebrospinalflüssigkeit entsprechenden Inhaltes (cf. pag. 13.); sodann die Transparenz, das Fehlen einer centralen nabelförmigen Einziehung an der Geschwulst, das Fehlern von Lähmungserrscheinungen seitens der Extremitäten, der Blase und des Mastdarms, endlich die Lage des Rückenmarks in fast normaler Form im Grunde der Wirbelrinne. Diesem entgegen spräche für eine *Myelocoele sacralis* der genau mediane Sitz an der charakteristischen Stelle, der breite Stiel, der bedeutende Knochendefect am Kreuzbein (cf. Untersuchungsbefund pag. 12), das Hervortreten gerade durch die Lücke, welche die *Myelocoele sacralis* herausläßt. Das Verhalten des Rückenmarks spricht allerdings vollständig gegen eine *Myelocoele*, da dieses, wenn gleich tiefer als normal herabreichend nicht — wie es für *Myelocoele* charakteristisch — mit der Innenwand des Duracksackes verwachsen erschien und auch der Flüssigkeitsack nicht — wie es für *Myelocoele* von Tournoux und Martin an 8 reifen und einer siebenmonatlichen Frucht gefunden wurde — vom Rückenmark und einzelnen Nervensträngen durchzogen erschien, welche sich mittels Fäden und Ligamenten an der hintern Sackwand befestigten.

Es ist demnach der vorliegende Sakraltumor als eine

Meningocele aufzufassen complicirt mit Spaltung aller Bogen des Kreuzbein.

Wegen des Tiefstandes des Rückenmarkes, welches hier bis zum ersten Sakralwirbel reichte, während es normalerweise nach den Untersuchungen von Fehst*) bei Kindern von 1—3 Monaten nur bis zum untern Rand des II. Lumbalwirbel reichen sollte, dürfte unser Tumor als eine solche Meningocele zu betrachten sein, die als aus einer Myelocele durch Lösung des Markes von seiner Verwachungsstelle und Zurücksinken in den Wirbelkanal entstanden gedacht werden könnte.

Wir schliessen uns nämlich in Betreff der Aetiologie der Spina bif. den Anschauungen an wie sie zuerst von Ranke**) ausgesprochen und später durch Tourneux***) und Dr. W. Koch erhärtet worden sind. Danach käme es zu der Veränderung des ganzen Rückenmarks, wie man es bei Rachischisis totalis findet, wenn Hornblatt und Medullarplatte, die ursprünglich zusammenhängende Bestandtheile ein und derselben Schicht, des obern Hornblattes sind, so fest verbunden bleiben, daß dadurch die Aufrollung der Medullarplatte zum Medullarrohr und auch zugleich die Wirbelfäule an ihrem hintern Verschlusse verhindert wird. Das Rückenmark stellt in diesem Falle keinen Cylinder vor, sondern ein flächenhaftes Gebilde, weil es die eigenthümliche Umgestaltung zum Rohre nicht durchgemacht. Bleibt nun aber nur an begrenzter Stelle die Verbindung von Hornblatt und Medullarplatte ungelöst zu einer Zeit, wo die Medullarplatte sich zum Rohr zusammengefaltet und geschlossen hat, so muß an der betreffenden Stelle der

*) Ueber das Verhältniß des Rückenmarks zur Länge der Wirbelfäule. Inaugural Differtat. St. Petersburg 1874.

**) Centralzeitung der Kinderheilkunde von Baginsky und Monti 1878 I. Jahrgang. S. 195.

***) Tourneux et Martin: Journal de l'anat. et de la physiol. 1881, p. 1 et 283.

Verchluss der Wirbelbogen zum Ring ausbleiben und der Conus medullaris wird meistens gleich dicht unter der Haut, ja zuweilen nur unter dünner Epidermis-Lage in fester Verbindung mit der äußern Decke liegen.

Entwickeln sich dann später die Rückenmarkshäute und mit ihnen die Absonderung von Cerebrospinalflüssigkeit, — vielleicht noch vermehrt durch einen chronisch entzündlichen Zustand der Meningen (Virchow) — so werden sie nebst dem adhärennten Rückenmark aus dem Defect der Wirbelbogen hydrocelenartig herausgestülpt, wir haben eine Myelocoele. — Eine Befonderheit gewährt in unserm Falle der Inhalt der Meningocoele, dessen Untersuchung es bestätigte, dass die Zusammensetzung der Flüssigkeit im Sacke der Spin. bif. sich kaum von der beim Hydrocephalus und dem normalen Lig. cerebro-spin. unterscheidet. Es bestand auch hier nur ein mäßiger Eiweißgehalt und eine reichliche Menge von Chloriden, außerdem aber wurde durch die Trommer'sche Traube eine nicht unerhebliche Menge von Traubenzucker nachgewiesen. Es ist dies gewiss etwas Seltenes, da nach einer von Wernitz *) vorgenommenen Zusammenstellung mehrfacher Analysen nur in einem Falle von Spin. bif. Zucker gefunden wurde. Auch nach Hoppe-Seyler **) findet sich in der normalen Cerebrospinalflüssigkeit kein Zucker und es fehlt in Spin. bif. und Hydrocephalus-Flüssigkeit die Kupferoxydredaction in der bei der ersten Punktion erhaltenen Flüssigkeit und wenn Entzündungserrscheinungen nicht aufgetreten sind. In unserm Falle rührte aber die Untersuchungsflüssigkeit von der ersten Eröffnung des Spin. bif. - Sackes her und fehlten auch alle Entzündungserrscheinungen.

Nachdem wir unsern Fall einer genauern Betrachtung unterzogen haben, sei es uns noch gestattet, die Fälle von

*) Wernitz, Spin. bif. Dissert. inaugural, Dorpat 1880. S. 50.

**) Hoppe-Seyler, Physiol. Chemie 1881, pag 604.

Spina bifid. aus der Litteratur zusammenzustellen, welche nach der Arbeit von Wernitz über Spin. bif. bekannt geworden sind.

Es ist uns zu diesem Zwecke möglich gewesen, noch 84 Fälle von Spina bifida außer den von Wernitz angeführten aus der Litteratur zusammenzustellen.

Wir halten es für geboten hier zu erwähnen, dafs wir dieser Zusammenstellung im wesentlichen die Arbeit von Demme*) zu Grunde gelegt haben.

Von diesen 84 Fällen hatte der die congenitale Affection der Wirbelfäule begleitende Tumor seinen Sitz.

In 5 Fällen über den Halswirbeln. In einem dieser Fälle fehlte dabei, wie die nachmalige Autopsie ergab, das unterste Segment der Hinterhauptschuppe und die Vereinigung der Bogen des Atlas, des Epistropheus, sowie des 3 ten und 4 ten Halswirbels.

In 2 ferneren Fällen über dem untersten Hals- und obersten Brustwirbel.

In 1 Falle über sämtlichen Hals- und den zwei obern Brustwirbeln.

In 15 Fällen ausschließlich über Brustwirbeln.

In 2 Fällen fanden sich zwei Geschwülste über den Brustwirbeln und zwar in einem Falle eine Geschwulst über dem III. und IV. und eine andere über dem VII. und VIII. Brustwirbel, in einem zweiten Fall eine solche über dem I. und II. und eine andere über dem VIII. und IX. Brustwirbel.

In 27 Fällen über den Lendenwirbeln.

In 15 Fällen über dem untersten Lendenwirbel und einem oder mehreren Kreuzbeinwirbeln.

In 12 Fällen ausschließlich über dem Kreuzbein.

In 4 Fällen war der Sitz des Tumor nicht angegeben und in einem Falle von Rhachischisis bestand kein Tumor.

Unter diesen 84 Fällen bestand:

*) Demme 20 med. Bericht über die Thätigkeit des Kinderspitals in Bern 1882, pag. 57.

6 Mal eine Meningocele spinalis ohne Spaltung oder Defect der Wirbelfäule.

(Austritt der Meningocele durch die Intervertebral-Löcher).

32 Mal eine Meningocele spinalis mit mehr weniger großem Defect an den Wirbelbogen.

2 Mal eine den eben erwähnten ähnliche Meningocele nur gingen das eine Mal zwei, das andere ein Nervenfasern zur Innenwand des Sackes, während sich das Rückenmark sonst normal verhielt.

38 Mal eine Myelocele.

Einmal bestand Rhachischisis anterior et posterior im Bereich der Hals und 10 obern Brustwirbel, sowie eine Spaltung der processus spinosi der Kreuzbeinwirbel, während der 12te Brust- und die Lendenwirbel normal erschienen.

Einmal eine Meningocele sacral. ant. Es war die Geschwulst im kleinen Becken an der Vorderseite des Kreuzbein und wurde die Austrittsstelle für den Stiel gebildet durch ein Fehlen der rechten Hälfte des II Sakralwirbel zusammen mit dem I Sakralloch.

4 Mal findet sich die Angabe einer Meningocele, ohne daß auf das Bestehen eines Defectes an der Wirbelsäule Rücksicht genommen ist.

Von Complicationen sind verzeichnet:

20 Mal ein in geringerem oder höherem Grade entwickelter Hydrocephalus.

17 Mal angeborner Klumpfuß.

3 Mal eine einfache Harnscharte, 2 Mal Lähmung der beiden untern Extremitäten, 1 Mal eine Ektopia vesicae und 1 Mal eine Hernia diaphragmatica und universaler Hydrops der Frucht.

Unter diesen 84 Fällen, von denen 42 operirt und 42 nicht operirt wurden, ergab sich bei letzterer Gruppe:

In 2 Fällen eine Heilung durch Spontanruptur des Sackes, in einem Falle Heilung ohne Ruptur und in einem Falle

machte der Tumor bis zum Tode, im Alter von 55 Jahren an einem Herzfehler, keine Beschwerden.

Der Tod trat ein

bis zum 8 ten Tage	in	4	Fällen
zwischen dem 8—14	„	„	11 „
„ „ 15—12	„	„	9 „
„ „ 23—30	„	„	5 „
im Alter von 3—4 Monaten	„	3	„
„ „ „ 5	„	1	„
„ „ „ 8	„	1	„
„ „ „ 12	„	1	„
am Ende des 2 Lebensjahres	„	1	„

In 2 Fällen ist über den Verlauf nichts angegeben. — Die Todesursache war bei den eben vorher erwähnten Fällen:

Bei 10 Kindern Marasmus ohne Ruptur des Sackes, bei 17 Kindern Ruptur des Sackes, bei 2 Ruptur des Sackes während der Geburt. 7 Kinder endlich erlagen, im Verlauf des ohne besondere Veränderung der Rückenmarksaffection sich einstellenden Marasmus, interkurrirenden Erkrankungen und zwar in 4 Fällen ausgebreiteter Bronchopneumonie, in 2 Fällen akuter capillärer Bronchitis, in 1 Falle einer eitrigen Peritonitis:

In den 42 Fällen, welche zur Operation kamen, wurde vorgenommen:

Die Amputation in 5 Fällen, davon geheilt, gestorben				—	5
Die Excision nach Koch	„	1	„	„	1 —
„ „ mit Cauteri-					
sation	„	1	„	„	1 —
„ einfache Incision	„	2	„	„	1 1
„ Incision mit folgender					
Vereinigungsnaht	„	3	„	„	2 1
„ einfache Punktion	„	1	„	„	— 1

Die Punktion mit folgen-

der Compression in 2 Fällen, davon geheilt, gestorben

2 —

„ Punktion mit folgen-

der Jodinjektion „ 25 „ „ 12 10

u. 3 ungeheilt
entlassen

„ Ligatur „ 2 „ „ 2 —

Also bei 42 operativ. Fällen 21 geheilt 18 gestorben und
3 als nicht geheilt entlassen.

Wenn nun aus der statistischen Zusammenstellung dieser 84 Fälle allein mit Berücksichtigung des Verlaufs der Fälle, bei denen ein operativer Eingriff geschah oder nicht, ein besonderes Resultat für die Therapie noch nicht dürfte gezogen werden können, so glaube ich doch, daß dieses wohl möglich sein wird, wenn man zu dieser neuesten Zusammenstellung noch diejenigen hinzunimmt, welche bereits früher vorgenommen worden sind, welche Ausführung ich mir für eine spätere Zeit vorbehalten möchte.

Den Herren Geheimen Medizinalrärthen Prof. Dohrn und Neumann erlaube ich mir für die freundliche Unterstützung bei vorliegender Arbeit meinen besten Dank auszusprechen.

—

Benutzte Casuistik.

- 1) E. v. Bergmann. Zur Diagnose der angeborenen Sakralgeschwulst. Berliner klin. Wochenschrift Nr. 48. XXI. Jahrg. 2) R. G. Butcher. Dublin Journ. LXXII (3. Ser. Nr. 19) Nov. 1881 p. 392. 3) V. Cavagnis. Ann. univers. Vol. 263 p. 425 Maggio 1883. 4) Damman. Inaugural-Dissert. Berlin 1882. 5) Demme. 20. med. Bericht über d. Thätigkeit d. Jennnerfchen Kinderfpitals in Bern. 1882. p. 57. 6) Despres. Gaz. des Hôp. 4. 1883. 7) Douglas Lithgow. Brit. med. Journ. Febr. 11. 1882. 8) G. H. Elliot. Brit. med. Journ. Dec. 15. 1883. 9) Forrester. Laucet II 12. Sept. 1883. p. 499. 10) Giraudeau. Prognès mèd. XI p. 50. Jan. 26. 1883. 11) A. Pearce Gould. Clin. foc. Transact. XV p. 91. 1881. 12) R. Haug. Inaug.-Differt. München 1883. 13) Dr. Haffelmann. Mittheil. f. d. Ver. schlesw.-holst. Aerzte III. 8. 1883. p. 142. 14) R. T. Hayes. New-York med. Record. June 16. 1883. 15) A. Jeffrejon. Laucet. II. 15. Oct. 1883. 16) L. M. Little. Laucet. January 20. 1883. 17) Marchand. Arch. f. Gynäkol. Bd. XVIII 3. 1881. 18) Morton. Zufchrift an die Laucet II. p. 960. Dec. 2 1882. 19) C. Penruddok Brit. med. Journ. May. 12. 1883. 20) A. W. Mayo Robson. ibid. March. 24. 1883. p. 558. 21) Noble Smith. Laucet II. 5. Aug. 1883. p. 183.
-

Vita.

Ich, Alexander Franz Birkholz, wurde am 1. Februar 1857 zu Gut Neuhoof, Kreis Königsberg i. Ost-Preußen geboren. Meine Schulbildung erhielt ich auf der Realschule I. Ordnung zu Königsberg i. Pr. und bezog Michaeli 1876, die Universität zu Königsberg, um zunächst Naturwissenschaft zu studiren.

Später legte ich eine Gymnasial-Ergänzungsprüfung ab und studirte zu Greifswald, Tübingen und Königsberg Medizin.

Nach bestandnem tentamen physicum absolvirte ich am 17. Mai 1884 die Staatsprüfung zu Königsberg i. P.

Während meiner Studienzeit besuchte ich die Vorlesungen folgender Herren Professoren und Privatdocenten:

Baumgarten, Benecke, P. Bruns, A. Budge, J. Budge, Dohrn, v. Feilitzsch, Gerstäcker, Grünhagen, Hildebrandt, Jacobson, Jaffé, Kupfer, Landois, v. Liebermeister, Limpricht, Münster, Münter, Naunyn, Neumann, Oesterleu, Pincus, Schneider, Schönborn, Sommer, Stetter, v. Säxinger, Treitel, H. Vierordt, Vossius, v. Wittich.

Allen diesen meinen verehrten Lehrern meinen wärmsten Dank.
